Faunitaxys

Revue de Faunistique, Taxonomie et Systématique morphologique et moléculaire

Volume 14
Numéro 49

Juin 2026

ISSN (Print) : 2269 - 6016
ISSN (Online) : 2970 - 4960
Dépôt légal : Juin 2026

Faunitaxys

Revue de Faunistique, Taxonomie et Systématique morphologique et moléculaire

ZooBank : https://zoobank.org/79A36B2E-F645-4F9A-AE2B-ED32CE6771CC

Directeur de la publication, rédacteur, conception graphique et PAO:
Lionel Delaunay

Cette revue ne peut pas être vendue
Elle est distribuée par échange aux institutions (version papier)
et sur simple demande aux particuliers (format PDF)
à l'adresse suivante:

AFCFF (Association française de Cartographie de la Faune et de la Flore)
28, rue Voltaire, F- 42100 Saint Etienne
E-mail: faunitaxys.journal@gmail.com

Elle est disponible librement au téléchargement à partir du site:

https://faunitaxys.fr/

La parution de *Faunitaxys* est apériodique

Faunitaxys est indexé dans / ***Faunitaxys*** is indexed in:
- Zoological Record
Articles and nomenclatural novelties are referenced by:
- ZooBank (https://zoobank.org)
Online Archives:
- HAL (https://hal.archives-ouvertes.fr)
- Internet Archive (https://archive.org/details/faunitaxys)

Imprimée sur les presses de SPEED COPIE, 6, rue Tréfilerie, F- 42100 Saint-Etienne

Imprimé le 26 06 2026

https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(49)

Description d'une espèce nouvelle du genre *Euserica* Reitter, 1896 du Maroc (Coleoptera : Scarabaeidae, Melolonthinae, Sericini)

DENIS KEITH (1, *) & CÉDRIC ALONSO (2)

(1) 120, rue Gabriel Péri, F-28000 Chartres, France - denis.keith@orange.fr
- ZooBank : https://zoobank.org/841FF99A-A032-4703-86AD-2E38DC0CC92E - Orcid : https://orcid.org/0000-0002-2554-4325

(2) 17, Rue du Bourguet, 34230 Le Pouget, France - contact@rosalia-expertise.com
- ZooBank : https://zoobank.org/28FC4CA1-D6A2-419E-BF23-50FD4DD62D05

* Correspondant

Mots-clés :

Scarabaeidae ;
Melolonthinae ;
Sericini ;
Euserica ;
morphologie ;
taxonomie ;
description ;
nouvelle espèce ;
Maroc.

Résumé. – Une nouvelle espèce du genre *Euserica* Reitter, 1896 est décrite du Maroc et illustrée : *Euserica atlasica* **sp**. **nov**.

Keith D. & Alonso C., 2026. – Description d'une espèce nouvelle du genre *Euserica* Reitter, 1896 du Maroc (Coleoptera : Scarabaeidae, Melolonthinae, Sericini). *Faunitaxys*, 14(49) : 1 – 4.

DOI : https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(49)

ZooBank : https://zoobank.org/E6A3CFB9-6F2F-44A4-B377-5AC43DBA4AB4

Received: 31/03/2026 – *Revised*: 17/06/2026 – *Accepted*: 18/06/2026

Introduction

Lors d'un séjour au Maroc, l'auteur junior a récolté une *Euserica* qui ne correspondait qu'imparfaitement aux espèces connues jusqu'ici. Après étude et confrontation avec divers types, en particulier les espèces décrites par Jacques Baraud dans sa révision de 1965, il appert qu'il s'agit là d'une espèce nouvelle dont nous donnons la description ci-dessous.

Matériel et méthodes

Les spécimens ont tous été collectés par piégeage lumineux à l'aide d'une LepiLed Maxi Switch. Les photos des habitus de l'holotype mâle et du paratype femelle ont été réalisées à l'aide d'un objectif Canon MP-E 65 mm monté sur un appareil photo numérique Canon eos 7d. La technique utilisée est celle de l'empilement de focus (multi focus) à l'aide du logiciel CombineZP, chaque plan étant réalisé à partir de 25 à 50 clichés environ.

Acronymes utilisés

MNHN: Muséum national d'histoire naturelle, Paris.
MHNG: Muséum d'histoire naturelle, Genève.
CAC: coll. Cédric Alonso, Le Pouget.
CDK: coll. Denis Keith, Chartres.

Description

***Euserica atlasica* sp. nov.**

(Fig. 1-5)

ZooBank : https://zoobank.org/CEC92115-FB40-4723-A40B-AF0008A1BEC6

Holotype, ♂, Maroc, Aït Taghezoute, source du Tizgui, 31°30'07.0"N 7°27'11.1"W, 23.VI.2024, *ad lucem,* C. Alonso leg. (in coll. MNHN).

Paratypes: **33** ♂, **4** ♀ (dont une désignée comme **Allotype**), mêmes données (**1** ♂, **1** ♀ in coll. MNHN ; **2** ♂ in coll. MHNG ; **21** ♂, **2** ♀ in CAC ; **9** ♂, **1** ♀ in CDK).

Description de l'holotype (Fig. 1).

Longueur 8 mm. *Couleur* brun-rouge ou brun-jaune sur le dessus, l'avant-corps plus sombre, plus claire dessous et sur les pattes. Antennes et palpes jaunes. *Aspect* peu brillant.

Tête. – *Ponctuation* assez grossière et ridée sur le clypéus, simple, enfoncée et éparse sur le front. Marge antérieure du clypéus nettement plus large que les côtés, fortement relevée et assez profondément sinuée en triangle aplati, les angles antérieurs largement arrondis, plus relevés que la marge antérieure, qui paraît tridentée en vue arrière, l'angulosité médiane plus faible que les angles latéraux ; les marges latérales plus faiblement relevées ; joues saillantes formant un angle obtus net avec les côtés du clypéus. *Suture* clypéofrontale bien visible sous forme d'une ligne noire nette, presque caréniforme latéralement. *Front* quasi plan comme le disque du clypéus. *Antennes* de neuf articles, dont trois à la massue, article III plus long que les articles IV ou V, article VI disciforme.

Pronotum. – Convexe, transversal, près de deux fois plus large que long, pourvu d'une ponctuation double, la plus grosse, dense, aussi forte que sur le front, un peu plus forte en arrière et la micro-ponctuation éparse ; avec une large dépression irrégulière et peu marquée vers les angles antérieurs, une autre plus petite près des angles postérieurs. Marge antérieure nettement rebordée, bien convexe au milieu, ciliée latéralement seulement. Marge postérieure non rebordée sauf brièvement devant les angles postérieurs, légèrement saillante en lobe large au milieu, faiblement sinuée de part et d'autre. Marges latérales largement arrondies dans la moitié antérieure, à peu près droites et parallèles en arrière, ciliées, rebordées, explanées aux angles antérieurs, bien aigus en vue latérale ; angles postérieurs droits, mousses.

Scutellum. – Triangulaire à ponctuation dense, épargnant une ligne médiane longitudinale.

Élytres. – Un peu plus larges que le pronotum à la base, s'élargissant vers l'arrière. *Stries* assez densément et fortement ponctuées, les points distants entre eux d'un diamètre de point à plus. Les deux premiers interstries ponctués de même, les autres moins densément, mais la convexité costale n'est pas lisse. Quelques points sétifères présents. *Epipleures* larges sous le calus huméral, puis s'amenuisant légèrement et progressivement jusqu'à l'arrondi apical externe des élytres, bien délimités par des reliefs caréniformes de part et d'autre ; apex élytral aplati, l'angle externe large, peu net ; angle sutural élytral droit.

Reviewer :
Guido Sabatinelli (*Muséum d'histoire naturelle, Genève, Suisse*) - https://zoobank.org/48E45DD7-5660-43A5-BBA2-D67BDC825346 - https://orcid.org/0000-0001-7197-0619

This is an open access article under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs License, which permits use and distribution in any medium, provided the original work is properly cited, the use is non-commercial and no modifications or adaptations are made.
Copyright 2026. The Authors. *Faunitaxys* published by Lionel Delaunay on behalf of the AFCFF (Association française de Cartographie de la Faune et de la Flore).

Pygidium. – *Ponctuation* assez grossière et dense, transversal et peu convexe.

Pattes. – *Métafémurs* larges, aplatis, à ponctuation éparse et deux rangs de points sétigères un peu râpeux. *Métatarses* à article I aussi long que le plus grand éperon terminal des métatibias. *Protibias* bidentés sur la marge extérieure, éperon apical interne plus court que le protarse I, protarses II et III sensiblement égaux entre longueur, protarse IV un peu plus court.

Abdomen. – *Mésosternum* légèrement plus étroit que les mésofémurs médians, antérieurement plat et imponctué, présentant en arrière une convexité portant une série de rugosités et de longs poils spiniformes ; marge postérieure légèrement concave. *Métasternum* plan, légèrement concave au centre, avec un net sillon longitudinal bien imprimé délimité à l'avant par une petite protubérance, à ponctuation forte et éparse et de gros points pilifères fortement râpeux de part et d'autre, puis une petite plage quasi imponctuée. *Sternites abdominaux* à forte et assez dense ponctuation et une rangée postérieure de points sétigères râpeux.

Edéage (Fig. 3-5).

Femelle (Fig. 2). – Très semblable au mâle, mais un peu plus grande et à élytres plus élargis, les appendices et la massue antennaire plus courts.

Derivatio nominis. – En référence à l'origine géographique, le Haut Atlas.

Discussion. – Le genre *Euserica* Reitter, 1896 compte actuellement 16 espèces, essentiellement distribuées en Espagne (9 espèces ; dont 3 que l'on retrouve également au Portugal et 1 en France) et au Maroc (7 espèces) (Fig. 6) (Agoiz-Bustamamante & al., 2010 ; 2011 ; Ahrens & Bezděk, 2016 ; Baraud, 1965 ; 1975 ; 1985 ; 1992 ; Galante, 1985 ; 1987 ; López-Colón, 1988 ; 1997a ; 1997b ; 2024a ; 2024b ; Ruiz & Ávila, 1993 ; 1995 ; 1999 ; Schoolmeesters, 2026).
E. atlasica **sp**. **nov**. se rapproche par la forme de ses paramères de *E. monticola* Baraud, 1965 et de *E. mamorensis* Baraud, 1965, dont nous avons pu étudier les séries typiques au Muséum national d'histoire naturelle de Paris.
E. monticola Baraud, 1965 présente cependant un aspect plus brillant, un clypéus profondément entaillé en demi-lune, avec des angles antérieurs nettement relevés et saillants, peu larges, presque dentiformes et fortement gibbeux, le pronotum moins transverse, sa marge antérieure non convexe, avec un calus large et net latéral, les élytres peu élargis vers l'arrière, la ponctuation élytrale très dense et uniformément répartie, le mésosternum tronqué droit postérieurement et aussi large que les mésofémurs.
E. mamorensis Baraud, 1965 présente un aspect plus brillant, un clypéus profondément entaillé en demi-lune, avec des angles antérieurs largement arrondis, le clypéus et le front convexes, le pronotum avec une dépression seulement près des angles antérieurs, sa marge antérieure peu convexe, sa marge postérieure nettement mais plus ou moins longuement rebordée, les angles antérieurs peu aigus, les angles postérieurs obtus, les élytres à ponctuation élytrale dense et uniformément répartie sur les deux premiers interstries seulement, la carène épipleurale interne très atténuée et le pygidium à ponctuation fine et dense.

Remerciements

Ce travail n'aurait pas été possible sans l'aide de M. Olivier Montreuil (MNHN) pour l'accès aux collections et de M. Guido Sabatinelli (MHNG) pour sa relecture du manuscrit et les photos de l'édéage : qu'ils en soient chaleureusement remerciés.

Références

Agoiz-Bustamante J.L., Blázquez Caselles A. & Garretas Muriel V.A., 2010. – El género *Euserica* Reitter, 1896, nuevas aportaciones a su distribución en la Península Ibérica. *Arquivos Entomolóxicos*, 4: 53 - 57.

Agoiz-Bustamante J.L., Blázquez Caselles A. & Garretas Muriel V.A., 2011. – *Euserica mutata* (Gyllenhall, 1817), nueva especie para Galicia, Noroeste de la Península Ibérica (Col., Melolonthidae, Sericinae). *Arquivos Entomolóxicos*, 5: 143 - 144.

Ahrens D. & Bezděk A., 2016. – *Sericini*. In: Löbl, I. & Löbl, D. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3. Scarabaeoidea — Scirtoidea — Dascilloidea — Buprestoidea — Byrrhoidea*. Revised and updated edition. Brill, Leiden, Boston, pp. 281 - 317.

Baraud J., 1965. – Révision des *Euserica, Neomaladera, Serica* et *Maladera* des pays européens et circumméditerranéens (*Col. Scarabaeidae*). *Annales de La Société Entomologique de France (N.S.)* Paris, 1(1): 71 - 116.

Baraud J., 1975. – Coléoptères Scarabaeoidea nouveaux ou méconnus de Espagne et du Maroc (Coleoptera). *Eos. Revista Española de Entomología*, Madrid, 49: 37 - 47.

Baraud J., 1985. – *Coléoptères Scarabaeoidea*. Faune du Nord de l'Afrique du Maroc au Sinaï. Editions Lechevalier Paris. *Encyclopédie Entomologique*, 1 - 650.

Galante E., 1987. – *Euserica paenibaeticae* sp. nov. de la Península Ibérica y redescripción de *Euserica segurana* (Brenske, 1897) (*Col. Scarabaeoidea Melolonthidae*). *Boletín de La Asociación Española de Entomología*, 11: 347-354.

Baraud J., 1992. – *Coléoptères Scarabaeoidea d'Europe*. Féderation Française des Sociétés de Sciences Naturelles. Faune de France, 78:1 - 856

López-Colón J. I., 1988. – *Euserica pauliani, n.sp.* appartenant à la faune espagnole (Coleoptera, Scarabaeoidea). *L'Entomologiste*, Paris, 44(5): 257 - 259

López-Colón J. I., 1997a. – Étude de la série typique et désignation du lectotype de *Serica ariasi* Brenske, 1897 (*Col. Scarabaeidae, Melolonthinae*). *L'Entomologiste*, 53(1): 37 - 38

López-Colón J. I., 1997b. – Étude de la série typique et désignation du lectotype de *Serica segurana* Brenske, 1897 (Col. Scarabaeidae, Melolonthinae). *L'Entomologiste*, 53(1): 39.

López-Colón J. I., 2024a. – *Euserica lopeznievaorum n.sp.* (*Coleoptera, Scarabaeidae, Melolonthinae*) Ibérica. *Biocosme Mésogéen*, 41(1-2): 11-18.

López-Colón J. I., 2024b. – *Euserica fernandezcarbajalesi n.sp.* (*Coleoptera, Scarabaeidae*) nueva especie Ibérica. *Biocosme Mésogéen*, 41(3-4): 11 - 17.

Ruiz J. L. & Ávila J. M., 1993. – Descripción de dos nuevas especies del género *Euserica* Reitter, 1896 del Norte de Africa (*Coleoptera: Scarabaeoidea: Melolonthidae*). *Elytron*, 7: 111 - 121.

Ruiz J. L. & Ávila J. M., 1995. – *Euserica brancobaraudi n.sp.* de Marruecos y comentarios sobre algunas especies íbero-norteafricanas del género *Euserica* Reitter, 1896 (*Coleoptera, Melolonthidae*). *Nouvelle Revue d'Entomologie*, Paris (N.S.), 12(1): 95 - 103.

Ruiz J. L. & Ávila J. M., 1999. – Nuevos datos corológicos de tres especies de *Euserica* (Reitter, 1896) (Coleoptera, Scarabaeoidea: Melolonthidae). *Zoologica baetica*, 9: 213 - 215.

Schoolmeesters P., 2026. – World Scarabaeidae Database (version 2026-02-04). In O. Bánki, Y. Roskov, M. Döring, G. Ower, D. R. Hernández Robles, C. A. Plata Corredor, T. Stjernegaard Jeppesen, A. Örn, T. Pape, D. Hobern, S. Garnett, H. Little, R. E. DeWalt, J. Miller, T. Orrell & R. Aalbu, *Catalogue of Life* (2026-02-13 XR. – Catalogue of Life Foundation, Amsterdam, Netherlands. https://doi.org/10.48580/d38g (accédé le 26.III.2026).

Fig. **1**-**5**. ***Euserica atlasica*** **sp**. **nov**.

1. Holotype. **2**. Allotype. **3**-**5**. Edéage. **3**. Vue latérale gauche. **4**. Vue arrière. **5**. Vue latérale droite.



Fig. **6**. Distribution du genre *Euserica* Reitter, 1896 au Maroc.

Contribution des auteurs [1]

Correspondance avec l'éditeur. – DK.
Rédaction de l'article. – DK, CA
Relecture de l'article. – DK, CA
Description. – DK, CA
Travail bibliographique. – DK
Travail de terrain. – CA
Etude du matériel. – DK, CA
Auteurs des figures. – DK, CA

[1] **DK** = Denis Keith – **CA** = Cédric Alonso.

Abstract

Keith D. & Alonso C., 2026. – Description of a new species in the genus *Euserica* Reitter, 1896 (Coleoptera: Scarabaeidae, Melolonthinae, Sericini) from Morocco. *Faunitaxys*, 14(49) : 1 – 4.

A new species of *Euserica* Reitter, 1896 is described from Morocco, and illustrated: *Euserica atlasica* **sp**. **nov**.

Keywords. – Scarabaeidae, Melolonthinae, Sericini, *Euserica*, morphology, taxonomy, description, new species, Morocco.

Derniers articles publiés

Guerbas-Ababsa C., Coache A. & Delfosse E., 2026. – Taxinomie et biogéographie des phasmes (Phasmatodea) de France. Notes sur les populations sexuées méridionales de *Bacillus rossius rossius* (Rossi, 1790). *Faunitaxys*, 14(28) : 1 – 16. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(28)

Lourenço W. R. & Velten J., 2026. – Description of a new genus and species associated to the family Chaerilobuthidae Lourenço & Beigel, 2011 from Early Cretaceous Burmite (Chelicerata: Scorpiones). *Faunitaxys*, 14(29): 1 – 8. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(29)

Ythier E. & Lourenço W. R., 2026. – A new species of *Brotheas* C. L. Koch, 1838 from Brazilian Amazonia (Scorpiones: Chactidae). *Faunitaxys*, 14(30): 1 – 7. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(30)

Platia G., Mertlik J. & Dušánek V., 2026. – New species, new records, new sex descriptions and new combinations of click beetles from China (Coleoptera, Elateridae). *Faunitaxys*, 14(31): 1 – 35. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(31)

Vives E., 2026. – Dos nuevas especies del género *Echinovelleda* Breuning, 1936 (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). Longicornios nuevos de Vietnam (Pars 14). *Faunitaxys*, 14(32) : 1 – 4. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(32)

Vincent B., 2026. – Révision du genre *Bernathonomus* Fragoso, 1953 et description de deux espèces nouvelles et quatre sous espèces (Insecta Lepidoptera Erebidae Arctiinae). *Faunitaxys*, 14(33) : 1 – 17. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(33)

Cerda J.-A., 2026. – Ctenuchina de Guyane française (2de partie). Les genres *Pseudagyrta - Pseudohyaleucerea - Kohllius - Polygonoptera - Orbiptera & Morvania* (4e article). 21e note. *Faunitaxys*, 14(34) : 1 – 17. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(34)

Dalens P.-H. & Robin F., 2026. – Un nouvel Hemilophini de Guyane : *Iatuca beneluzi* **sp**. **nov**. (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae). *Faunitaxys*, 14(35) : 1 – 5. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(35)

Félis O., 2026. – Description of a new genus and four species of Neotropical Lasiocampidae with new combinations (Lepidoptera: Lasiocampidae, Poecilocampinae, Macromphaliini). *Faunitaxys*, 14(36): 1 – 13. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(36)

Heffern D. & Santos-Silva A., 2026. – Cerambycinae (Coleoptera, Cerambycidae) from Mexico and Honduras: new species of Elaphidiini and a new country record in *Chrysoprasis*. *Faunitaxys*, 14(37) : 1 – 17. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(37)

Hodeček J., Zahradník P., Pirkl J. & Háva J., 2026. – A faunistic contribution to the knowledge of Bostrichidae (Coleoptera) in the Dominican Republic. *Faunitaxys*, 14(38): 1 – 5. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(38)

Delahaye N., T'Joen L. & Drumont A., 2026. – Etude du genre *Xaurus* Pascoe, 1867 (1ère partie) : Historique du genre avec la description d'une nouvelle espèce d'Indonésie (Coleoptera, Cerambycidae, Prioninae, Macrotomini, Remphanina). *Faunitaxys*, 14(39) : 1 – 14. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(39)

Vitali F., 2026. – A new *Dymasius* J. Thomson, 1864 from Borneo (Coleoptera, Cerambycidae). *Faunitaxys*, 14(40): 1 – 3. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(40)

Pierre Juhel P. & Alain Coache A., 2026. – Description d'un nouveau genre et d'une espèce nouvelle de Cerambycidae de l'Archipel de Sao Tomé et Principe (Cerambycinae, Hesperophanini). *Faunitaxys*, 14(41) : 1 – 6. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(41)

Zhang Y., Marazzi G. & Marazzi V., 2026. – *Gilmouria furiosa* – a new genus and species of Macrotomini (Cerambycidae: Prioninae) from Madagascar. *Faunitaxys*, 14(42): 1 – 6. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(42)

Botjes L., Pham P.V. & Ahrens D., 2026. – Two new *Lasioserica* species from China and Vietnam (Coleoptera: Scarabaeidae: Sericinae). *Faunitaxys*, 14(43) : 1 – 6. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(43)

Roguet J.-P., 2026. – Contribution à la connaissance des Lamiinae du Mexique (Coleoptera, Cerambycidae). *Faunitaxys*, 14(44) : 1 – 10. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(44)

Háva J., 2026. – *Bouchardophagus* **gen**. **nov**., a new genus of Mycetophagidae (Coleoptera) from Chile. *Faunitaxys*, 14(45): 1 – 3. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(45)

Sanap R., Kadam G., Thackeray T., Rajkumar M. & Satam Y., 2026. – A new species of the genus *Selenocosmia* Ausserer, 1871 (Araneae: Theraphosidae) from the karst landscapes of Meghalaya, India. *Faunitaxys*, 14(46) : 1 – 9. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(46)

Lapèze J. & Swing K., 2026. – Le genre *Havilandia* (Hemiptera : Membracidae), avec la description d'une nouvelle espèce vivant sur des racines aériennes de *Philodendron* (Araceae). *Faunitaxys*, 14(47) : 1 – 15. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(47)

Santos-Silva A., Bezark L. G. & Pérez-Flores O., 2026. – Similar, but not identical: descriptions of four new species of Acanthocinini (Coleoptera, Cerambycidae, Lamiinae), with additional new geographical records and notes. *Faunitaxys*, 14(48) : 1 – 13. https://doi.org/10.57800/faunitaxys-14(48)

Faunitaxys est échangée avec les revues suivantes (« print versions »)

– Annali del Museo Civico di Storia Naturale G. Doria (Italie)
– Boletín de la Asociación española de Entomología (Espagne)
– Boletín de la Sociedad Andaluza de Entomología (Espagne)
– Bollettino del Museo di Storia Naturale di Venezia (Italie)
– Bulletin de la Société linnéenne de Lyon (France)
– Bulletin of Insectology (Italie)
– Heteropterus Rev. Entomol. (Espagne)
– Integrative Systematics (Allemagne)
– Israel Journal of Entomology (Israel)
– Klapalekiana (République Tchèque)
– Koleopterologische Rundschau (Allemagne)
– Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona (Italie)
– Nova Supplementa Entomologica (Allemagne)
– Proceedings of the Entomological Society of Washington (USA
– Revue suisse de Zoologie (Suisse)
– Spixiana (Allemagne)
– Zoosystematica Rossica (Russie)

Faunitaxys

Volume 14, Numéro 49, Juin 2026

SOMMAIRE

Description d'une espèce nouvelle du genre *Euserica* Reitter, 1896 du Maroc (Coleoptera : Scarabaeidae, Melolonthinae, Sericini).

Denis Keith & Cédric Alonso . . . . . 1 – 4

CONTENTS

Description of a new species in the genus *Euserica* Reitter, 1896 (Coleoptera: Scarabaeidae, Melolonthinae, Sericini) from Morocco.

Denis Keith & Cédric Alonso . . . . . 1 – 4

Illustration de la couverture :

L'oasis "caché" de Fint, à proximité de Ourzazate.

Crédits:

Denis Keith : Fig. 1-2.
Guido Sabatinelli : Fig. 3-5.

Publié par l'Association Française de Cartographie de la Faune et de la Flore (AFCFF)